



Beipackzettel online - ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.  
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern zu Fragen  
rund um das Produkt - per E-Mail: [service@mycare.de](mailto:service@mycare.de) oder per Telefon:  
0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen: [www.mycare.de](http://www.mycare.de)

[Zum Produkt »](#)

## **Cerotalgin Spray**

### 1. Was ist das Medizinprodukt Cerotalgin Spray und wofür wird es angewendet?

Cerotalgin Spray ist ein Produkt, das der Entfernung von Ohrenschmalz (Cerumen) im äußeren Gehörgang dient. Die regelmäßige Anwendung von Cerotalgin Spray trägt zur Aufrechterhaltung der Hygiene im Ohr bei und verhindert die Bildung von Ohrenpfropfen.

Cerotalgin Spray enthält:

- Natriumdocusat dient der Reinigung des Gehörganges;
- Ringelblume dient der Beruhigung.

Die Anwendung des Medizinprodukts Cerotalgin Spray kann die Bildung von Ohrenpfropfen verhindern, wodurch eine Verschlechterung der Hörqualität vermieden werden kann. Cerotalgin Spray enthält keine Konservierungsstoffe.

### 2. Beachten Sie vor der Anwendung des Medizinprodukts folgendes:

Bitte wenden Sie das Medizinprodukt Cerotalgin Spray nicht an, wenn eine Trommelfellperforation, eine Ohrinfektion, ein Ausfluss aus dem Ohr oder eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe vorliegt.

Das Medizinprodukt ist für Erwachsene und Kinder (ab einem Jahr) bestimmt. Zur Anwendung bei Kindern unter einem Jahr sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden.

### 3. Wie Sie das Medizinprodukt Cerotalgin Spray anwenden:

Für eine regelmäßige Pflege der Ohren wenden Sie das Medizinprodukt 1- bis 2-mal pro Woche an. Um angesammeltes Ohrenschmalz zu entfernen, wenden Sie das Medizinprodukt an drei aufeinander folgenden Tagen an.

Halten Sie den Sprühaufsatz vor den Eingang des Gehörganges und sprühen Sie einen Sprühstoß ein. Bei Bedarf kann die Anwendung mehrmals am Tag wiederholt werden. Spülen Sie das Ohr nach ein paar Minuten aus.

### 4. Mögliche Nebenwirkungen

Bei Überempfindlichkeit können Hautausschlag, Juckreiz und Rötungen auftreten.

### 5. Lagerungshinweis

Wenden Sie das Medizinprodukt nach Ablauf des Haltbarkeitsdatum nicht mehr an.

Nicht bei Temperaturen über 25 °C lagern, für Kinder unzugänglich aufbewahren.